Ziołowa Tradycja syrop prawoślazowy 125 g

Opis

Ziołowa Tradycja syrop prawoślazowy jest byliną charakteryzującą się silnie rozwiniętym systemem korzeniowym. Jako surowiec farmaceutyczny najczęściej stosuje się korzenie prawoślazu Althaeae radix. Prawoślaz lekarski jest bogatym źródłem substancji śluzowych oraz flawonoidów, w tym tylirozydu, który wykazuje działanie przeciwzapalne. Z korzeni prawoślazu najczęściej sporządza się syrop prawoślazowy stosowany w kaszlu i przeziębieniu, osłaniająco na górne drogi oddechowe. Korzenie prawoślazu mogą być używane do sporządzenia maceratu, stosowanego w podrażnieniach i stanach zapalnych błony śluzowej jamy ustnej, gardła i przełyku. Kolejną formą preparatów wytwarzanych z korzeni prawoślazu są mieszanki ziołowe, stosowane w stanach zapalnych górnych dróg oddechowych, suchym kaszlu, anginie.

Składniki

Prawoślaz lekarski 100 g syropu zawiera: macerat z korzenia prawoślazu – 35,9 g (ekwiwalent 5 g korzenia prawoślazu), ekstrahent: mieszanina wody i etanolu (47:1), kwas benzoesowy 0,1 g. Zawartość etanolu (760 g/l) nie więcej niż 1,1 % (m/v). Substancje pomocnicze: kwas benzoesowy – 1 g, sacharoza – 64 g.

Sposób użycia

Dorośli i dzieci powyżej 12. roku życia – trzy razy na dobę po 15 ml. Dzieci poniżej 12 lat: trzy razy na dobę po 5 ml. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Działanie

Skuteczność syropu oparta jest na długim okresie stosowania i doświadczeniu. Korzeń prawoślazu zawiera substancje śluzowe, które działają osłaniająco i łagodzą podrażnienia błon śluzowych jamy ustnej i gardła.

Wskazania

Stosowany w chorobach gardła i układu oddechowego. W kaszlu, w przebiegu stanów zapalnych górnych dróg oddechowych.

Ważne informacje

- Syrop jest przeciwwskazany w przypadku nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników.
- Ze względu na zawartość kwasu benzoesowego nie należy go stosować u pacjentów z astmą oskrzelową.
- Zawiera sacharozę – jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, przed przyjęciem leku pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.
- Zawiera 186 mg etanolu (alkoholu) w dawce jednorazowej dla dorosłych, co jest równoważne 4,7 ml piwa lub ok. 2 ml wina. Ze względu na zawartość alkoholu nie zaleca się podawania pacjentom z chorobami wątroby, padaczką oraz chorobą alkoholową.
- Ze względu na zawartość etanolu (alkoholu) lek nie powinien być stosowany u dzieci do 6. roku życia.
- Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
- W okresie karmienia piersią nie zaleca się stosowania productu.